




Fichier écologique des essences

Fiche de terrain

❶ Zone bioclimatique :

❷ Topographie

Position




Exposition

• Si pente < 20 % (12°) ——— Secteur neutre ☐

Secteur froid ☐

• Si pente > 20 % (12°) :



Apports d'eau

☐ Par les précipitations uniquement
(plateau, haut de versant, convexité)

☐ Apports d'eau variables
(bas de versant, replat, concavité,
axe drainant)

☐ Alimentation constante
(fond de vallée, zone de source)

3 Sol

Lithologie :

Type d'humus :

pH de l'horizon humifère :

(pH en profondeur) :

Texture :

Charge caillouteuse et profondeur




5-15 %



15-50 %



> 50 %



Profondeur du sondage :

Phase :

Nature de la charge :



Profondeur (cm)	Pierrosité		
	5-15 %	15-50 %	> 50 %
> 125	0		
80-125	1		
40-79	2	2	3
20-39	4	4	5
< 20		6	6

Horizon argileux ou compacté :

Présence :



Profondeur :

Profondeur d'apparition du pseudogley : cm

Profondeur d'apparition du gley : cm

Profondeur (cm)

Drainage du sol (sols limoneux et argileux)	Type de drainage	Classe	Pseudogley	Gley
Sans pseudogley	Excessif	a*	x	
	Favorable	b	>125	
À pseudogley	Modéré	c	80 - 125	
	Imparfait	d	50 - 80	
	Assez pauvre	h	30 - 50	
	Pauvre	i	0 - 30	
À gley	Assez pauvre	e		> 80
	Pauvre	f		40 - 80
	Très pauvre	g		< 40

* La classe de drainage « a - excessif » est réservée aux situations de drainage interne extrêmes, comme on peut en rencontrer dans les sols sableux.

Type de profil :